

Hypoparathyroidisme

Utbredelse, symptomer og konsekvenser for livskvaliteten

Konsekvenser for livskvaliteten ved hypoparathyroidisme



Hypoparathyroidisme (også kalt hypopara) er en **sjelden endokrin sykdom** som skyldes **for lave nivåer av paratyroidhormon (PTH)** i kroppen.



Biskjoldkjertlene ligger bak skjoldbruskkjertelen i halsen. De produserer PTH, som er primærregulatoren av kalsium og fosfat i kroppen ved å påvirke skjelett og nyrer direkte og tarmen indirekte. Hvis biskjoldkjertlene fjernes, blir ødelagt eller ikke fungerer, kan det føre til for lave nivåer av PTH.



Hypopara kan oppstå som følge av genetikk, autoimmune sykdommer og andre årsaker. Den vanligste årsak til hypopara er **halsoperasjoner som utgjør 75 %** av alle tilfeller



Hypopara anses som kronisk hvis tilstanden vedvarer i mer enn seks måneder etter operasjon, ifølge 2016 Endocrine Society Guidelines, 2019 Canadian and International Consensus Statement og 2022 European Society of Endocrinology.



Det anslås at 3,2 av 10 000 innbyggere i EU har hypopara.

Konsekvenser for livskvaliteten ved hypoparathyroidisme

Belastningen av hypopara kan få negative konsekvenser for helse-relatert **livskvalitet**, **fysisk funksjonsevne** og **psykisk trivsel**, uavhengig av serumkalsiumnivåer.

I en studie* av personer som lever med hypopara, oppga respondentene følgende konsekvenser for hverdagen, den mentale helsen og det sosiale livet og relasjoner.



Hverdag

79 %

klarte ikke å gjøre like mye i hjemmet

43 %

oppga at hypopara påvirker evnen til å jobbe

67 %

klarte ikke å gjøre like mye som de pleide å gjøre/ønsker å gjøre



Mental helse

81 %

følte seg engstelige eller opplevde angst

64 %

følte seg frustrerte

62 %

følte seg deprimerte eller triste



Aktivitet

76 %

var ikke i stand til å trene på samme måte

52 %

er mindre aktive enn de pleide å være/ønsker å være

50 %

var ikke like mobile (inkludert evnen til å gå)



Sosialt liv og relasjoner

79 %

var mindre i stand til å engasjere seg i sosiale aktiviteter

57 %

var mer begrenset i hvilke typer sosiale aktiviteter de kunne delta i

43 %

opplyste at dette påvirker relasjonene med familie

*Studie av 42 voksne med hypoparathyroidisme.